


GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ* IZOLIACIJOS ALGORITMAS nuo lapkričio 17 d.



Asmuo turėjo didelės rizikos COVID-19 kontaktą



Visiems sąlytį turėjusiems asmenims bendraujant su kitais asmenimis rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones, stebėti sveikatos būklę, matuoti kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą mažiausiai 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos. Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuotis ir registruotis PGR tyrimo atlikimui.

*Galimai imunitetą COVID-19 ligai turinčiais asmenimis laikomi tie, kurie yra:

- persirgę COVID-19 (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus);
- turintys teigiamą SARS-CoV-2 PGR ar antigeno tyrimą, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR ar antigeno testo praėjo mažiau nei 210 dienų, ir (arba) turintys teigiamą SARS-CoV-2 kiekybinio arba pusiau kiekybinio serologinio tyrimo (išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepavimo COVID-19 ligos vakcina) rezultata,
- paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną schemą*** (praėjus 14 dienų po vakcinacijos),
- paskiepyti COVID-19 ligos vakcina sustiprinančiąja doze.****

**Izoliacija būtina iki antikūnų tyrimo rezultato.

Standardizuotas kiekybinis, pusiau kiekybinis ar kokybinis serologinis anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas, kurio specifiskumas siekia ne mažiau 98 proc. anti-N SARS-CoV-2 IgG turi silpną koreliaciją su viruso neutralizacijos efektu ir šiai rekomendacijai netinkamas.

***Suėjus 14 dienų po COVID-19 vakcinos dozės suleidimo:

- antra vakcinos doze, kai skiepavimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
- viena vakcinos doze, kai skiepavimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
- bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

****Laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepavimo schemą ir persirgęs COVID-19 liga, kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.